



## Caratteristiche

- Miscuglio rustico, adatto al taglio diretto
- Insilato ricco di proteine, fibra e amido
- Indicato per impianti di biogas e biometano
- Il favino fissa azoto: meno concimazione azotata
- Zona di coltivazione consigliata: tutta Italia

## Composizione

- Triticale
- Favino



## Indicazioni agronomiche

|                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dose di semina</b>    | 200-210 kg/ha, alla profondità di 3-4 cm in funzione del tipo di terreno e della preparazione del letto di semina                                    |
| <b>Epoca di semina</b>   | Autunnale: da metà ottobre a metà novembre                                                                                                           |
| <b>Utilizzo</b>          | Insilato (zootecnia, biogas e biometano)                                                                                                             |
| <b>Ciclo</b>             | Tardivo                                                                                                                                              |
| <b>Epoca di raccolta</b> | Biomassa: trinciatura in piedi alla maturazione latteo-cerosa del triticale. Uso zootecnico: sfalcio e breve preappassimento prima della trinciatura |
| <b>Concimazione</b>      | Circa 80 unità di N/ha in totale; in base alle dotazioni del suolo integrare alla semina con 60-70 unità/ha di P e altrettante di K                  |
| <b>Resa del sacco</b>    | Un sacco da 25 kg semina circa 1.200-1.250 m <sup>2</sup> ; per un ettaro servono circa 8 sacchi                                                     |
| <b>Confezione</b>        | Sacco da 25 kg, seme trattato                                                                                                                        |

La composizione del miscuglio può subire variazioni per miglioramento o aggiornamento varietale. I dati riportati sono indicativi e vanno adattati alle condizioni pedoclimatiche locali.